



PROVA SCRITTA N. 1

- 1) **Nell'esecuzione del tracciato ECG gli elettrodi da posizionare agli arti seguono lo schema:**
 - a. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde alla caviglia sx
 - b. elettrodo rosso al braccio sx, elettrodo nero alla caviglia dx, elettrodo giallo al braccio dx, elettrodo verde alla caviglia dx
 - c. elettrodo rosso al braccio dx, elettrodo nero alla caviglia sx, elettrodo giallo al braccio sx, elettrodo verde dx

- 2) **Quali fra questi sono parametri vitali:**
 - a. diuresi, pressione arteriosa, frequenza respiratoria
 - b. stato di coscienza, frequenza cardiaca, temperatura corporea
 - c. frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, temperatura corporea

- 3) **La letteratura secondaria è:**
 - a) Letteratura costituita dalla revisione di pubblicazioni primarie o aggregate
 - b) Letteratura di natura concettuale
 - c) Letteratura di secondo livello di consultazione

- 4) **Si definisce emottisi:**
 - a. emissione di espettorato misto a sangue
 - b. emissione di vomito misto a sangue digerito (quindi scuro)
 - c. emissione di sangue dalle narici

- 5) **La portata cardiaca è:**
 - a. La quantità del sangue pompata dal cuore nelle 24 ore
 - b. La quantità di sangue pompata dal cuore nell'unità di tempo
 - c. Il numero di diastole cardiache nell'unità di tempo

- 6) **La complessità assistenziale è determinata da:**
 - a. tipologia dei bisogni da soddisfare, grado di dipendenza della persona e instabilità clinica
 - b. numero degli infermieri presenti in turno
 - c. motivo del ricovero



- 7) La cute di un arto edematoso appare:
- lucida e cianotica
 - lucida e pallida
 - grinzosa e cianotica
- 8) L'immobilità è il fattore di rischio principale per lo sviluppo di lesioni da compressione in quanto l'applicazione di pressioni per un tempo prolungato determinano un danno ischemico. Quale valore viene indicato come limite massimo da non superare?
- 22 mmhg
 - 52 mmhg
 - 32 mmhg
- 9) La pressione arteriosa sistemica minima coincide con
- il rilascio del ventricolo di sinistra
 - la contrazione del ventricolo di sinistra
 - il rilascio del ventricolo di destra
- 10) A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 739/94 e dell'abolizione del "mansionario" L. n.42/99, il campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato dai contenuti del:
- profilo professionale, contratto di lavoro, codice deontologico
 - profilo professionale, codice deontologico, formazione di base ordinamenti didattici e formazione post base
 - codice deontologico, contratto di lavoro, linee guida nazionali
- 11) La ripresa dell'alimentazione e dell'idratazione dopo un intervento chirurgico:
- è da considerarsi in relazione al tipo d'intervento, al tipo di anestesia, alla ripresa della peristalsi e alle condizioni generali della persona
 - è da considerarsi quando la persona ha appetito
 - avviene dopo la ripresa della peristalsi
- 12) Come definisci la minzione dolorosa e spasmodica?
- disuria associata a piuria
 - poliuria associata ad oliguria
 - nessuna delle precedenti



13) Quali delle seguenti complicanze NON è da attribuire alla nutrizione entrale?

- a. meteorismo
- b. tenesmo**
- c. nessuna delle precedenti

14) I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono:

- a. gli indumenti e/o i presidi che deve indossare l'operatore sanitario allergico
- b. i contenitori in cui devono essere riposti per essere smaltiti gli aghi, le lame da bisturi e gli altri oggetti taglienti
- c. gli indumenti e/o i presidi specifici che l'operatore sanitario deve indossare per salvaguardare in particolare la cute, gli occhi e la bocca dall'esposizione ai germi patogeni**

15) Il drenaggio toracico è un drenaggio:

- a. di tipo aspirativo
- b. di tipo chiuso e aspirativo**
- c. di tipo aperto a caduta

16) Il DM 739/94 enuncia che l'Infermiere:

- a. garantisce la corretta applicazione delle procedure diagnostico-terapeutiche
- b. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali
- c. tutte le precedenti**

17) Si definisce febbre intermittente:

- a. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura torna su valori normali**
- b. quando la temperatura si mantiene costantemente al di sopra della norma con oscillazioni non superiori a 0.5°C
- c. quando tra un rialzo termico ed il successivo la temperatura si abbassa senza raggiungere valori normali

18) Quando l'infermiere deve effettuare un lavaggio antisettico delle mani?

- a. prima di un contatto diretto con pazienti ricoverati in terapia intensiva o immunocompromessi o con lesioni alla cute
- b. prima e dopo l'esecuzione di procedure invasive**
- c. prima e dopo l'esecuzione di medicazioni

19) L'obbligo di formazione continua per le professioni sanitarie, secondo il modello ECM è stato introdotto



- a. con il D.Lgs. n. 229 del 1999
b. con il D.Lgs. n.517 del 1993
c. nessuna delle precedenti risposte è corretta
- 20) Gli effetti secondari della radioterapia sono principalmente: disfagia, odinofagia, mucosite. La persona sottoposta a tale trattamento ha un rischio elevato di deficit nutrizionale. L'infermiere deve prioritariamente:
- a. facilitare la deambulazione e il movimento
b. promuovere e sostenere una nutrizione adeguata
c. nessuna delle precedenti
- 21) L'insufficienza aortica è causata dal rigurgito di sangue che va:
- a. dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
b. dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
c. dall'atrio sinistro all'aorta ascendente
- 22) Un polso con frequenza < 60 Battiti/minuto si definisce
- a. filiforme
b. aritmico
c. bradicardico
- 23) Indicare quale tra le seguenti vie è la preferita per l'introduzione di un catetere venoso centrale:
- a. femorale
b. safena
c. succlavia
- 24) A quale stadio della lesione da pressione corrisponde la seguente descrizione: *lesione a tutto spessore con distruzione estesa, necrosi del tessuto o danneggiamento del muscolo, osso o delle strutture di supporto "tendine o capsula articolare"*
- a. III stadio
b. IV stadio
c. V stadio
- 25) Con il termine epidemia si intende:
- a. il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
b. la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio



c. la comparsa di malattie per le quali non è ancora stato individuato un vaccino

26) Le vertebre cervicali sono:

- a. 10
- b. 5
- c. 7**

27) Lo strumento che documenta integralmente l'intero processo di assistenza infermieristica è :

- a. il registro nosologico
- b. il protocollo di assistenza infermieristica
- c. la cartella infermieristica**

28) Qual è la velocità in gtt/min per infondere 1000 ml di soluzione fisiologica in 20 ore con un regolatore di flusso con rapporto ml/gtt di 1/20?

- a. 300 gtt/min
- b. 50 gtt/min
- c. 30 gtt/min

29) Una delle scale che valuta il rischio di caduta è:

- a. Scala Analogica numerica
- b. Scala di Conley**
- c. Scala di Braden

30) La posizione indicata per la toracentesi è:

- a. ortopnoica**
- b. trendelenburg
- c. supina

31) La sterilizzazione è un processo chimico o fisico che porta all'eliminazione di:

- a. gran parte delle forme microbiche viventi comprese le spore
- b. ogni forma microbica vivente comprese le spore**
- c. tutti i batteri patogeni escluse le spore

32) L'igiene della colostomia deve essere effettuata:

- a. solo con acqua
- b. con acqua e sapone**
- c. con soluzione disinfettante non a base alcolica



33) La contaminazione di una ferita prevede:

- a. nessuna delle risposte è corretta
- b. la presenza di infezione
- c. la presenza di microrganismi non replicanti

34) La prestazione infermieristica è:

- a. un complesso di azioni coordinate
- b. un insieme di atti fisici/verbali/mentali
- c. l'esecuzione di una tecnica infermieristica

35) Indica la corretta differenza tra antisettico e disinfettante:

- a. L'antisettico è un agente sterilizzante, il disinfettante riduce la carica batterica
- b. L'antisettico è un disinfettante usato su oggetti e materiali inanimati, il disinfettante è usato sulle persone
- c. L'antisettico è una sostanza usata sulla persona (cute e mucose), il disinfettante è una sostanza usata per oggetti e materiali inanimati

36) Per gittata cardiaca si intende:

- a. la quantità di sangue che passa nei tessuti al minuto
- b. il volume di sangue pompato dal ventricolo al minuto
- c. il numero di battiti del cuore al minuto dovuti alla sua contrazione

37) Il dotto di Botallo:

- a. mette in comunicazione la vena cava superiore e l'atrio destro
- b. mette in comunicazione l'atrio sinistro e il ventricolo destro
- c. mette in comunicazione l'arteria polmonare e l'aorta

38) Nella preparazione di una iniezione d'insulina, è corretto:

- a. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene aria, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- b. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità d'insulina da prelevare
- c. iniettare con la siringa, nello spazio del flacone che contiene insulina, la quantità di aria corrispondente alla quantità doppia d'insulina da prelevare

39) L'art. 1 della legge n. 251 del 10 agosto 2000 chiarisce che gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria delle ostetriche svolgono assistenza:



- a. con autonomia professionale e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
- b. con autonomia professionale limitata ed espletando le funzioni previste dagli specifici codici
- c. con autonomia professionale limitata e utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi

40) Dopo essersi accertati che un paziente è in arresto cardiocircolatorio l'Infermiere deve:

- a. chiamare ad alta voce il paziente e scuoterlo per valutare la coscienza
- b. iniziare immediatamente le manovre di R.C.P. e chiamare l'anestesista non appena possibile
- c. seguire un elettrocardiogramma

INFORMATICA

In Excel è possibile ordinare anche colonne che contengono testo?

Si sempre

INGLESE

1. Nonadherence to aseptic catheter care recommendations has been associated with an increased risk of bacteriuria; conversely, systemic antibiotics have a protective effect on bacteriuria

La mancata aderenza alle raccomandazioni per la cura del catetere asettico è stata associata ad un aumentato rischio di batteriuria; Al contrario, gli antibiotici sistemici hanno un effetto protettivo sulla batteriuria



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini