



Vaccinazione anti COVID-19 con vaccino Pfizer-BioNTech mRNA BNT162b2 (COMIRNATY®)

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE (1° DOSE) E APPUNTAMENTO PER 2° DOSE

Si certifica che in **data:** ____ / ____ / ____ alle **ore:** ____, ____ c/o: Pini CTO Polo FFO

Il/la sig./sig.ra _____, nato/a il ____ / ____ / ____ a _____

Codice Fiscale _____, recapito telefonico _____

Ha ricevuto la 1° dose del vaccino anti COVID-19 con vaccino Pfizer-BioNTech mRNA BNT162b2 (COMIRNATY®)

N° lotto **dose 1** sul deltoide del braccio: sinistro destro

PORTI QUESTA SCHEDA AL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Conservi questa scheda come promemoria finché non riceverà la seconda dose del vaccino.

L'appuntamento per la 2° dose è fissata per il GIORNO ____ / ____ / ____ alle ORE ____, ____

È importante ricevere due dosi a distanza di 3 settimane (e comunque non oltre 42 giorni).

DOSE 1 – Timbro e firma del medico / dell'operatore sanitario

N° lotto **dose 2** sul deltoide del braccio: sinistro destro

somministrato in **data:** ____ / ____ / ____ alle **ore:** ____, ____ c/o: Pini CTO Polo FFO

DOSE 2 – Timbro e firma del medico / dell'operatore sanitario

Può segnalare una reazione avversa sospetta a:

Agenzia Italiana del Farmaco sito web: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>

NOTA INFORMATIVA - COMIRNATY (BioNTech/Pfizer) (agg. 21.4.2021)

Cos'è Comirnaty e a cosa serve

Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Comirnaty viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni. Il vaccino induce il sistema immunitario (le difese naturali dell'organismo) a produrre gli anticorpi e le cellule del sangue attive contro il virus, conferendo così una protezione anti COVID-19. Poiché Comirnaty non contiene il virus per indurre l'immunità, non può trasmettere COVID-19.

Cosa deve sapere prima di ricevere Comirnaty

Comirnaty non deve essere somministrato se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati di seguito).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o all'operatore sanitario del centro vaccinale prima di ricevere il vaccino se:

- ha avuto una grave reazione allergica o problemi respiratori dopo l'iniezione di un altro vaccino o dopo avere ricevuto Comirnaty in passato;
- è svenuto dopo un'iniezione;
- ha una malattia o un'infezione grave con febbre alta. Tuttavia, se ha una febbre lieve o un'infezione delle vie respiratorie superiori (come un raffreddore) potrà comunque ricevere la vaccinazione;
- ha un problema di sanguinamento, una tendenza alla formazione di lividi, o se usa medicinali per prevenire la formazione di coaguli di sangue;
- ha un sistema immunitario indebolito, a causa di una malattia come l'infezione da HIV, o di medicinali che influenzano il sistema immunitario, come i corticosteroidi.

Altri medicinali e Comirnaty

Informi il medico o l'operatore sanitario del centro vaccinale se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale, o se le è stato somministrato di recente qualsiasi altro vaccino.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico prima di ricevere questo vaccino.

I dati relativi all'uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono limitati. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione di Comirnaty durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto.

Durata della protezione e limitazioni dell'efficacia del vaccino

La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla. Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino.

È pertanto essenziale continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni di sanità pubblica (mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani).

Come viene somministrato Comirnaty

Comirnaty viene somministrato dopo diluizione sotto forma di iniezione intramuscolare nella parte superiore del braccio. È previsto un richiamo ed è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata 3 settimane (e comunque non oltre 42 giorni) dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione.

È molto importante che venga eseguita la seconda somministrazione per ottenere una risposta immunitaria ottimale. Qualora dimenticasse di tornare alla data prestabilita per la seconda somministrazione si rivolga al suo medico curante o al centro vaccinale dove è stata somministrata la prima dose.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

- | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nel sito di iniezione: dolore, gonfiore | <input type="checkbox"/> brividi |
| <input type="checkbox"/> stanchezza | <input type="checkbox"/> dolore articolare |
| <input type="checkbox"/> mal di testa | <input type="checkbox"/> diarrea |
| <input type="checkbox"/> dolore muscolare | <input type="checkbox"/> febbre |

Effetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):

- arrossamento nel sito di iniezione
- nausea
- vomito

Effetti indesiderati non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100):

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ingrossamento dei linfonodi | <input type="checkbox"/> insonnia |
| <input type="checkbox"/> senso di malessere | <input type="checkbox"/> prurito nel sito di iniezione |
| <input type="checkbox"/> dolore agli arti | <input type="checkbox"/> reazioni allergiche quali eruzione cutanea o prurito |

Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 persona su 1.000):

- asimmetria temporanea di un lato del viso
- reazioni allergiche quali orticaria o gonfiore del viso

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, anche se non elencati di sopra, si rivolga al medico curante o contatti il centro vaccinale.

Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>).

Cosa contiene Comirnaty

Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.

Gli altri componenti sono: ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315); 2- [(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfolcolina (DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidrato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili.