

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL LA COPERTURA DI  
N. 1 POSTOI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI LOGOPEDISTA:  
PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE.**

La Commissione rileva che per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame si deve fare riferimento agli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 e al bando di concorso, e che dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- **30 punti per i titoli;**
- **70 punti per le prove d'esame.**

Ai sensi dell'art. 35-quarter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art. 1 bis del D.L. n. 44 del 22/04/2023, convertito con modificazioni in L. n. 74 del 21/06/2023 e come previsto dal bando è prevista la sola prova scritta.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, **di almeno 49/70.**

I punti per la valutazione dei **titoli** sono così ripartiti:

- **15 punti per i titoli di carriera;**
- **4 punti per i titoli accademici e di studio;**
- **4 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;**
- **7 punti per curriculum formativo e professionale.**

L'idoneità alla prova scritta è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza di almeno 49/70.


Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova scritta.

Ai fini della graduatoria il punteggio conseguito nella prova di esame sarà sommato a quello riportato nella valutazione dei titoli, il totale così ottenuto rappresenterà la votazione complessiva di ogni candidato.

Il giorno mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 9.00 presso l'aula Panzeri dell'ASST Gaetano Pini CTO – p.zza C. Ferrari 1, Milano si è riunita la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Logopedista (Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari – ruolo sanitario), indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 10/10/2024.

La Commissione, costituita con deliberazione n. 23 del 23/01/2025 risulta così composta:

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| - dott. Giovanni Antonio Mutillo | Direttore della UOC DAPSS di questa ASST<br>Presidente titolare                                      |
| - dott.ssa Arianna Di Marzo      | Logopedista di questa ASST<br>Componente titolare  |
| - dott.ssa Flavia Spalletti      | Logopedista della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale<br>Maggiore Policlinico<br>Componente titolare |
| - dott.ssa Martina Santambrogio  | Collaboratore Amm.vo Professionale di questa ASST<br>Segretario                                      |



## PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà nella soluzione di un test a risposta multipla: la commissione ha predisposto 3 possibili prove tra cui un volontario estrarrà quella che costituirà il test d'esame uguale per tutti.

Per la prova scritta ogni test è **composto da 40 domande**: ciascuna domanda è corredata da 3 possibili risposte.

- Punteggi attribuiti per la prova scritta (sufficienza punti 49 su 70):
  - risposta esatta punti 1,75 p.ti;
  - risposta errata punti 0 p.ti;
  - risposta non data punti 0 p.ti.

Ogni prova contiene 40 domande a risposta multipla, una domanda per l'accertamento della lingua inglese e una domanda per l'accertamento delle conoscenze informatiche (queste ultime non generano un punteggio).

La Commissione predispose la seguente terna di prove per la prova scritta, consistenti in 3 test di 40 domande a risposta multipla: ciascuna domanda è corredata da 3 possibili risposte.

Per ottenere la sufficienza e pertanto essere dichiarati idonei i candidati dovranno rispondere correttamente a 28 domande.

I tre test, tra cui è stato estratto quello che ha costituito l'oggetto d'esame uguale per tutti, sono i seguenti:

- prova scritta 1) :  
(allegata prova scritta 1 - le risposte corrette sono quelle segnate in giallo).
- prova scritta 2) :  
(allegata prova scritta 2 - le risposte corrette sono quelle segnate in giallo).
- prova scritta 3) :  
(allegata prova scritta 3 - le risposte corrette sono quelle segnate in giallo).

La prova estratta è la prova scritta n. 1.

Letto, confermato e sottoscritto.

### LA COMMISSIONE

#### PRESIDENTE

(dott. Giovanni Muttillo)

#### COMPONENTI

(dott.ssa Arianna Di Marzo)

(dott.ssa Flavia Spalletti)

#### SEGRETARIO

(dott.ssa Martina Santambrogio)



PROVA SCRITTA N. 1

*Pravil extrinatte  
26/2/25 Tanti*

**1) L'Evidence-based medicine è:**

- a. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici e dai professionisti sanitari
- b. un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente e dai caregiver
- c. un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca

**2) Il segreto professionale cui sono vincolati i professionisti sanitari concerne:**

- a. la diagnosi relativa alla persona assistita
- b. solo i dati anagrafici delle persone assistite
- c. ogni notizia che può essere considerata un segreto relativo al paziente


**3) Quali test utilizzare per valutazione delle abilità narrative in un bambino di 4 anni?**

- a. Bus story
- b. BVSCO-3
- c. Caselli

**4) Quale test utilizzerebbe per valutare la comprensione del testo orale nella scuola secondaria di primo grado?**

- a. Zardini
- b. CO-TT
- c. PING





10  
11  
12



**5) Quali tra le seguenti prove vengono utilizzate per porre diagnosi di dislessia:**

- a. Correttezza e velocità di lettura di brano e liste di parole e non parole
- b. Velocità e comprensione della lettura di frasi omofone
- c. Velocità e comprensione della lettura di parole quadrisillabiche

**6) Quali sono i primi aspetti da osservare durante la valutazione di un bambino di 3 anni non verbale con sospetto disturbo dello spettro autistico?**

- a. Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, pointing, risposta al nome, comprensione di consegne semplici
- b. Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, comprensione delle inferenze, pointing, narrazione autobiografica
- c. Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, risposta al nome, denominazione lessicale, discriminazione fonologica


**7) Come viene definito il processo fonologico in cui il bambino sostituisce un suono sordo con il corrispondente suono sonoro?**

- a. sonorizzazione
- b. stopping
- c. anteriorizzazione

**8) La CAA è:**

- a. utilizzata unicamente all'interno di istituti riabilitativi e scuole specializzate
- b. utilizza tabelle e dispositivi elettronici in alternativa a gesti e vocalizzi
- c. utilizza le funzioni presenti e residue per ottenere uno scambio comunicativo







**9) Nello sviluppo della narrazione, la prima forma di racconto che il bambino mette in atto è:**

- a. Il racconto biografico
- b. Lo script
- c. Il racconto di fantasia

**10) Quale delle seguenti è una prova di valutazione delle abilità narrative di retelling?**

- a. Bus Story Test
- b. PFLI
- c. PVB


**11) Le procedure di screening per la disfagia dovrebbero includere:**

- a. Osservazione del livello di coscienza, dell'igiene orale, del controllo delle secrezioni e, se appropriato, un test del bolo d'acqua
- b. Una valutazione della funzione deglutitoria con cibi a diversa consistenza
- c. Una valutazione strumentale (FEES o VFS)

**12) Quali sono i vantaggi della cannula tracheostomica?**

- a. Riduzione del lavoro respiratorio, miglioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa
- b. Aumento del lavoro respiratorio, miglior comfort del paziente e aumento della necessità di terapia farmacologica sedativa
- c. Aumento della frequenza respiratoria, peggioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa







**13) Indicare l'esatta sequenza della manovra sovraglottica**

- a. il paziente esegue tre masticazioni a vuoto; inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua ancora tre masticazioni a vuoto
- b. il paziente effettua un colpo di tosse; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua un secondo colpo di tosse
- c. il paziente inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; mantiene l'apnea piena durante l'atto deglutitorio; effettua un colpo di tosse dopo la deglutizione

**14) Cosa si intende per penetrazione?**

- a. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo con superamento del piano glottico
- b. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo senza superamento del piano glottico
- c. ingresso del bolo nella cavità orale


**15) La presbifagia secondaria:**

- a. è dovuta ai soli processi fisiopatologici connessi con invecchiamento
- b. è sinonimo di disartria ed è riferita al soggetto aniano
- c. è presente in un soggetto anziano ma conseguente e secondaria ad uno stato patologico

**16) Quali tra queste è una complicanza della disfagia?**

- a. afasia di conduzione
- b. agnosia
- c. polmonite ab ingestis







**17) Cosa viene utilizzato per una diagnosi strumentale di disfagia?**

- a. somministrazione di questionari
- b. test del bolo d'acqua e valutazione dei nervi cranici
- c. FEES e VFS

**18) Il VII paio di nervi cranici corrisponde al:**

- a. facciale
- b. glossofaringeo
- c. ipoglosso

**19) Quale dei seguenti rientra tra i trattamenti restitutivi attivi della disfagia?**

- a. modificazioni dietetiche
- b. capo flesso in avanti
- c. manovra di Masako


**20) Secondo le "linee guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in foniatría e logopedia", l'alimentazione tramite PEG è raccomandata:**

- a. per tutti i pazienti con livello 7 alla scala DOSS
- b. mai con pazienti con stroke
- c. per periodi superiori alle 4 settimane

**21) Quali esercizi sono indicati per rinforzare i muscoli della deglutizione?**

- a. Linguali, labiali, guance
- b. Accordo pneumofonico
- c. Propriocezione e warming-up







**22) Nella malattia di Parkinson la disfagia compare solitamente:**

- a. dipende dall'età cronologica di insorgenza della malattia
- b. in media 10-11 anni dopo l'insorgenza dei disturbi motori
- c. solo fase terminale della malattia

**23) Nella valutazione della paralisi del facciale generalmente si utilizza:**

- a. Sunnybrook Facial Grading System
- b. Scala GIRBAS
- c. ENPA adattato

**24) Quali sono le cause alla base della disfagia post-estubazione?**

- a. aumento forza muscolare e acalasia esofagea
- b. trauma delle strutture faringee e laringee, ridotta sensibilità, debolezza muscolare
- c. buona coordinazione tra respiro e deglutizione


**25) L'esame utilizzato nelle procedure di screening audiologico alla nascita è:**

- a. ABR
- b. OAE
- c. Impedenzometria

**26) Per amnesia retrograda si intende la difficoltà:**

- a. A ricordare i volti conosciuti
- b. A ricordare i fatti autobiografici
- c. A rievocare i fatti accaduti prima dell'evento patologico







**27) Come si definisce una sordità neurosensoriale?**

- a. Ipoacusia che interessa l'orecchio esterno e medio
- b. ipoacusia che interessa il nervo acustico
- c. ipoacusia che interessa l'orecchio interno

**28) Da cosa è composto un impianto cocleare**

- a. un processore sonoro esterno e un ricevitore/stimolatore interno
- b. un microfono, un amplificatore e un altoparlante
- c. un altoparlante, un amplificatore e uno stimolatore interno

**29) Nella SLA in fase avanzata quale ausilio comunicativo si ritiene più rispondente alle esigenze della persona assistita?**

- a. puntatore oculare
- b. amplificatore vocale
- c. tastiere con uscita vocale

**30) La disfonia ipercinetica ci caratterizza per:**


- a. voce strozzata
- b. intensità debole
- c. fuga d'aria

**31) Per cosa è utilizzata la scala GIRBAS?**

- a. per la valutazione delle abilità prassico-costruttive
- b. per la valutazione strumentale della disfonia
- c. per la valutazione percettiva della disfonia



7





**32) Quale test è utilizzato per valutare la disartria?**

- a. ENPA
- b. Profilo di Robertson
- c. AAT

**33) Il Lee Silverman Voice Treatment è utile soprattutto nel trattamento della voce:**

- a. della demenza di Alzheimer
- b. nel trauma cranico
- c. nella malattia di Parkinson

**34) Una voce prodotta con insufficienza chiusura glottica può essere definita come:**

- a. rauca
- b. instabile
- c. soffiata


**35) Cosa si intende per bradicinesia?**

- a. difficoltà nella programmazione del movimento
- b. rigidità nell'esecuzione del movimento
- c. lentezza e diminuzione dell'ampiezza del movimento

**36) L'afasia è:**

- a. un disturbo prassico-verbale
- b. un disturbo di linguaggio acquisito
- c. un disturbo della produzione scritta







**37) Quale tra queste è un'afasia fluente?**

- a. afasia di Wernicke
- b. afasia globale
- c. afasia di Broca

**38) Quale tra questi è un deficit fonologico nell'afasia?**

- a. anomia
- b. neologismo fonemico
- c. circonlocuzione

**39) L'aprassia bucco-facciale in un paziente con disturbo neurologico è caratterizzata da:**

- a. deficit della forza della muscolatura del cavo orale preposti alla fonazione
- b. deficit nella produzione di movimenti volontari della bocca, faringe, muscoli del collo
- c. presenza di lesioni cerebrali dell'emisfero destro e lesioni primarie degli organi del vocal tract

**40) Il token test consente di evidenziare:**

- a. deficit di denominazione
- b. deficit di ripetizione
- c. deficit della comprensione orale

## INFORMATICA

**1) Nella terminologia informatica l'acronimo OTP si riferisce a:**

- a. One Time People
- b. On That PC
- c. One Time Password







## INGLESE

When you swallow, food passes through your mouth and into a part of your throat called the pharynx. From there, it travels through a long tube called the esophagus. It then enters your stomach. This movement is made possible by a series of actions from your muscles in these areas. If you have dysphagia, the muscles don't work correctly. You may not be able to swallow normally.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



10





**PROVA SCRITTA N. 2**

*prova non erogata*  
*26/2/25*  
*[Signature]*

**1) Il sistema di E.C.M (Formazione Continua in Medicina):**

- a. è previsto solo per i professionisti sanitari che lavorano presso Servizi Pubblici
- b. è obbligatorio solo per i professionisti che lavorano in ambito privato
- c. è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari

**2) Il profilo professionale del logopedista è individuato da:**

- a. DM 742/94
- b. L 170/2010
- c. L 140/92


**3) Quali prove effettuerebbe per valutare la comprensione morfosintattica in un bambino di 4 anni:**

- a. PVB
- b. PING
- c. TCGB-2

**4) Per una valutazione indiretta comunicativo-linguistica di un bambino di 10 mesi quale strumento utilizzerebbe:**

- a. Questionario Mc Arthur scheda parole e frasi
- b. Questionario Mc Arthur scheda gesti e parole
- c. PING







**5) Da che età è possibile fare diagnosi di discalculia?**

- a. Non prima della fine della terza primaria
- b. Non prima della fine della seconda primaria
- c. Non prima della fine della quinta primaria

**6) Il linguaggio caratterizzato da ecolalia è tipico di:**

- a. bambini con DPL in comprensione ed espressione
- b. bambini con disturbo dello spettro autistico
- c. bambini bilingui precoci

**7) I processi fonologici di sistema:**

- a. Indicano quei processi in cui all'interno della stessa parola si trovano almeno due processi contemporaneamente
- b. Riguardano la sostituzione di un fonema con un altro, mentre la sequenza sillabica rimane inalterata
- c. Indicano quei processi in cui vi è una persistente preferenza per dei suoni


**8) Si parla di bilinguismo consecutivo tardivo quando:**

- a. la seconda lingua è gestuale
- b. il bambino viene esposto alla seconda lingua a partire dai 6/7 anni
- c. il bambino viene esposto alla seconda lingua dalla nascita

**9) Cos'è la lallazione canonica:**

- a. la produzione ripetuta della stessa sequenza CV
- b. la ripetizione della prima parola
- c. il prolungamento di un suono







**10) Quale dei seguenti è classificabile come errore non fonologico?**

- a. "in sieme" anziché "insieme"
- b. "pitta" anziché "pizza"
- c. "aejo" anziché "aereo"

**11) Se durante la procedura di screening per disfagia si osserva che il paziente non può stare seduto con il tronco eretto e non riesce a rimanere sveglio per almeno 5 minuti come si procede:**


- a. Non somministrare nulla per bocca e mantenere l'igiene orale
- b. Iniziare l'alimentazione orale con cautela partendo da cibi morbidi
- c. Iniziare l'alimentazione orale con cautela partendo dai liquidi non zuccherati

**12) Nel paziente portatore di cannula tracheostomica cuffiata, quando è possibile eseguire una prova di scuffiatura?**

- a. Quando la valutazione logopedica non mostra alterazioni morfodinamiche del distretto orale
- b. Quando si è certi che non sono comparsi segni di disfagia durante l'assunzione degli alimenti
- c. Quando il paziente ha raggiunto la stabilità clinica e respiratoria

**13) La manovra sovraglottica:**

- a. prevede il prolungamento della fase di chiusura delle corde vocali tramite apnea, con lo scopo di impedire l'inalazione del bolo
- b. va attuata solo ed esclusivamente in presenza del logopedista
- c. fa parte delle posture di compenso utilizzate per la riabilitazione della disfagia





**14) Cosa si intende per inalazione/aspirazione?**

- a. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo con superamento del piano glottico
- b. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo senza superamento del piano glottico
- c. ingresso del bolo nella cavità orale

**15) Che cosa è la presbifagia?**

- a. E' la forma di disfagia dovuta ai processi fisiopatologici connessi con l'invecchiamento
- b. E' un sinonimo di afasia, ma riferita unicamente alla persona anziana
- c. E' una forma di demenza legata al fisiologico invecchiamento

**16) Quale dei seguenti è uno strumento di screening per la disfagia?**

- a. FEES
- b. GUSS
- c. FOIS


**17) Quale tra queste è una fase della deglutizione?**

- a. fase epatica
- b. fase faringea
- c. fase nasale

**18) Il XII paio di nervi cranici corrisponde al:**

- a. facciale
- b. glossofaringeo
- c. ipoglosso







**19) Quale dei seguenti rientra tra i trattamenti compensativi della disfagia?**

- a. modificazioni della consistenza di cibi e liquidi
- b. CTAR
- c. Manovra di Masako

**20) Cosa analizza lo SWAL-QoL?**

- a. La scialorrea nel paziente disfagico
- b. Quanto la disfagia incide sulla qualità della vita del paziente e dei *caregiver*
- c. Se parlare rappresenta un handicap per il paziente

**21) Quali esercizi sono indicati per il training masticatorio?**

- a. Manovre di autoinsufflazione
- b. Respirazione diaframmatica e accordo pneumofonico
- c. Protrusione e retrazione mandibolare, rinforzo dei masseteri


**22) Il muscolo cricoaritenideo laterale è un muscolo:**

- a. estrinseco laringeo
- b. adduttore della laringe
- c. abduttore della laringe

**23) Quale tra i seguenti interventi porta alla definitiva separazione tra vie aeree e digestive superiori?**

- a. cordectomia
- b. laringectomia sovraglottica
- c. laringectomia totale







**24) La disfagia nella SLA:**

- a. interessa solo la fase esofagea
- b. è caratterizzata da progressiva diminuzione della forza ed escursione laringea debole
- c. è dovuta ad una lesione del cervelletto

**25) Quale di questi è un test specifico per l'afasia progressiva primaria?**

- a. SAND- Screening for Aphasia in NeuroDegeneration
- b. Batteria Comprendo per la comprensione di frasi negli adulti
- c. APACS- Assessment of Pragmatic Abilities and Cognitive Substrates

**26) Le agende cartacee/elettroniche sono utilizzate soprattutto in caso di disturbo della:**

- a. Memoria di lavoro
- b. Memoria prospettica
- c. Attenzione sostenuta


**27) Come si definisce una sordità trasmissiva?**

- a. Ipoacusia che interessa l'orecchio esterno e medio
- b. ipoacusia che interessa il nervo acustico
- c. ipoacusia che interessa l'orecchio interno

**28) In seguito all'intervento chirurgico di impianto cocleare la regolazione degli elettrodi viene effettuata attraverso:**

- a. la telemetria neurale
- b. il mappaggio
- c. l'ABR







**29) Quali aree indaga il test di Robertson?**

- a. respirazione, fonazione, diadococinesi, riflessi, prosodia, articolazione, intelligibilità, muscolatura facciale
- b. fonazione, respirazione e attenzione selettiva
- c. respirazione, aprassia articolatoria, prosodia e memoria di lavoro

**30) In caso di paralisi laringea bilaterale in abduzione cosa si osserva:**


- a. La funzione respiratoria è gravemente compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono conservate
- b. la funzione respiratoria non è compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono compromesse
- c. la funzione respiratoria e la funzionalità fonatoria e sfinterica sono gravemente compromesse


**31) Quale tipo di disfonia caratterizza la malattia di Parkinson?**

- a. Ipocinetica
- b. Ipercinetica
- c. Atassica

**32) Che strumento, tra quelli utilizzati dal logopedista, viene identificato con la sigla VHI:**

- a. test di screening della deglutizione
- b. questionario di autovalutazione della disartria
- c. questionario di autovalutazione della voce







**33) Quali esercizi vengono raccomandati per il trattamento di una disfonia conseguente a intubazione orotracheale?**

- a. Esercizi a Tratto Vocale Semi-Occluso (SOVTE)
- b. Ripetizione di parole e frasi
- c. Glissati e scale

**34) Le corde vocali si trovano:**

- a. nella regione sottoglottica
- b. nella regione glottica
- c. nella regione sottoglottica

**35) Nella paralisi sopranucleare progressiva PSP, il sintomo cardine è:**

- a. tetraplegia progressiva
- b. afasia progressiva
- c. progressiva paralisi dello sguardo

**36) La comprensione verbale è una funzione complessa che dipende da:**

- a. area di Wernicke
- b. area di Broca
- c. aree parietali

**37) Quale tra questi è un deficit lessicale nell'afasia?**

- a. anomia
- b. parafasia fonemica
- c. conduite d'approche







**38) L'esame del linguaggio al Letto del Malato (ELLM) valuta il disturbo afasico in fase:**

- a. acuta
- b. cronica
- c. non valuta l'afasia

**39) Quale tra queste è un'afasia non fluente?**

- a. afasia di Wernicke
- b. afasia di conduzione
- c. afasia di Broca

**40) Nell'aprassia ideomotoria:**

- a. il soggetto sa cosa fare ma non sa come farlo
- b. il soggetto non sa cosa fare e non sa come farlo
- c. il soggetto non sa cosa fare ma sa come farlo


## INFORMATICA

**1) In ambito informatico UPS è un sistema di:**

- a) Di prevenzione perimetrale contro hacker e virus
- b) Alimentazione elettrica di emergenza, dotato di batterie
- c) Generazione elettrica, che fornisce tensione alternata

## INGLESE

When you swallow, food passes through your mouth and into a part of your throat called the pharynx. From there, it travels through a long tube called the esophagus. It then enters your stomach. This movement is made possible by a series of actions from your muscles in these areas. If you have dysphagia, the muscles don't work correctly. You may not be able to swallow normally.





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---



10





**PROVA SCRITTA N. 3**

*prova non estratta  
26/2/25  
[Signature]*

**1) L'evidence-based medicine è:**

- a) un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotto dai medici e dai professionisti sanitari
- b) un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente e dai caregiver
- c) un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca

**2) Il profilo professionale del logopedista è individuato da:**

- a) DM 742/94
- b) L170/2010
- c) L140/92

**3) Nel bambino con sindrome di Down l'intervento logopedico precoce sulle funzioni orali è raccomandato in quanto questi bambini sin dalla nascita presentano:**

- a) Iperprotezione buccale associata a rigurgito nasale
- b) Ipotonia, frequenti problemi respiratori, particolarità delle strutture anatomiche del cavo orale, sensibilità
- c) Acalasia esofagea che provoca una difficoltosa progressione del cibo con conseguenti disturbi del comportamento


**4) Quale delle seguenti è una prova di valutazione delle abilità narrative di retelling?**

- a) Bus Story Test
- b) PFLI
- c) PVB

**5) Come viene definito il processo fonologico in cui il bambino sostituisce un suono sordo con il corrispondente suono sonoro?**

- a) sonorizzazione
- b) stopping
- c) anteriorizzazione








- 6) **Quali sono i primi aspetti da osservare durante la valutazione di un bambino di 3 anni non verbale con sospetto disturbo dello spettro autistico?**
- Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, pointing, risposta al nome, comprensione di consegne semplici
  - Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, comprensione delle inferenze, pointing, narrazione autobiografica
  - Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, risposta al nome, denominazione lessicale, discriminazione fonologica
- 7) **Quali tra le seguenti prove vengono utilizzate per porre diagnosi di dislessia:**
- Velocità e comprensione della lettura di frasi omofone
  - Correttezza e velocità di lettura di brano e liste di parole e non parole
  - Velocità e comprensione della lettura di parole quadrisillabiche
- 8) **I processi fonologici di sistema:**
- Indicano quei processi in cui all'interno della stessa parola si trovano almeno due processi contemporaneamente
  - Riguardano la sostituzione di un fonema con un altro, mentre la sequenza sillabica rimane inalterata
  - Indicano quei processi in cui vi è una persistente preferenza per dei suoni
- 9) **Da che età è possibile fare diagnosi di discalculia?**
- Non prima della fine della seconda primaria
  - Non prima della fine della terza primaria
  - Non prima della fine della quinta primaria
- 10) **Quali prove effettuerebbe per valutare la comprensione morfosintattica in un bambino di 4 anni:**
- PVB
  - PING
  - TCGB-2







**11) Nel paziente portatore di cannula tracheostomica cuffiata, quando è possibile eseguire una prova di scuffiatura?**

- a) Quando la valutazione logopedica non mostra alterazioni morfodinamiche del distretto orale
- b) Quando si è certi che non sono comparsi segni di disfagia durante l'assunzione degli alimenti
- c) Quando il paziente ha raggiunto la stabilità clinica e respiratoria

**12) Quali sono i vantaggi della cannula tracheostomica?**

- a) Riduzione del lavoro respiratorio, miglioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa
- b) Aumento del lavoro respiratorio, miglior comfort del paziente e aumento della necessità di terapia farmacologica sedativa
- c) Aumento della frequenza respiratoria, peggioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa

**13) Cosa indaga lo SWAL-QoL?**

- a) La scialorrea nel paziente disfagico
- b) Quanto la disfagia incide sulla qualità della vita del paziente e dei caregiver
- c) Se parlare rappresenta un handicap per il paziente


**14) Indicare l'esatta sequenza della manovra sovraglottica**

- a) il paziente esegue tre masticazioni a vuoto; inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua ancora tre masticazioni a vuoto
- b) il paziente effettua un colpo di tosse; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua un secondo colpo di tosse
- c) il paziente inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; mantiene l'apnea piena durante l'atto deglutitorio; effettua un colpo di tosse dopo la deglutizione

**15) Il IX paio di nervi cranici corrisponde al:**

- a) facciale
- b) glossofaringeo
- c) ipoglosso







**16) Quali esercizi sono indicati per il training masticatorio?**

- a) Manovre di autoinsufflazione
- b) Respirazione diaframmatica e accordo pneumofonico
- c) Protrusione e retrazione mandibolare, rinforzo dei masseteri

**17) Che cosa è la presbifagia?**

- a) E' la forma di disfagia dovuta ai processi fisiopatologici connessi con l'invecchiamento
- b) E' un sinonimo di afasia, ma riferita unicamente alla persona anziana
- c) E' una forma di demenza legata al fisiologico invecchiamento

**18) Quale dei seguenti è uno strumento di screening per la disfagia?**

- a) FEES
- b) GUSS
- c) FOIS

**19) Cosa si intende per inalazione/aspirazione?**

- a) ingresso del bolo nel vestibolo laringeo con superamento del piano glottico
- b) ingresso del bolo nel vestibolo laringeo senza superamento del piano glottico
- c) ingresso del bolo nella cavità orale

**20) Quale dei seguenti rientra tra i trattamenti compensativi della disfagia?**

- a) modificazioni della consistenza di cibi e liquidi
- b) CTAR
- c) Manovra di Masako


**21) Cosa viene utilizzato per una diagnosi strumentale di disfagia?**

- a) somministrazione di questionari ai pazienti e caregiver
- b) test del bolo d'acqua e valutazione dei nervi cranici
- c) FEES e VFS

**22) Quali sono le cause alla base della disfagia post-estubazione?**

- a) aumento forza muscolare e acalasia esofagea
- b) trauma delle strutture faringee e laringee, ridotta sensibilità, debolezza muscolare
- c) buona coordinazione tra respiro e deglutizione








- 23) Secondo le “linee guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in foniatría e logopedia”, l’alimentazione tramite PEG è raccomandata:**
- a) per tutti i pazienti con livello 7 alla scala DOSS
  - b) mai con pazienti con stroke
  - c) per periodi superiori alle 4 settimane
- 24) Nella valutazione della paralisi del facciale generalmente si utilizza:**
- a) Sunnybrook Facial Grading System
  - b) Scala GIRBAS
  - c) ENPA adattato
- 25) Nella malattia di Parkinson la disfagia compare solitamente:**
- a) dipende dall’età cronologica di insorgenza della malattia
  - b) in media 10-11 anni dopo l’insorgenza dei disturbi motori
  - c) solo fase terminale della malattia
- 26) Da cosa è composto un impianto cocleare:**
- a) un processore sonoro esterno e un ricevitore/stimolatore interno
  - b) un microfono, un amplificatore e un altoparlante
  - c) un altoparlante, un amplificatore e uno stimolatore interno
- 27) Come si definisce una sordità trasmissiva?**
- a) ipoacusia che interessa il nervo acustico
  - b) ipoacusia che interessa l’orecchio esterno e medio
  - c) ipoacusia che interessa l’orecchio interno
- 28) Per amnesia retrograda si intende la difficoltà:**
- a) a ricordare i volti conosciuti
  - b) a ricordare i fatti autobiografici
  - c) a rievocare i fatti accaduti prima dell’evento patologico
- 29) Quale di questi è un test specifico per l’afasia progressiva primaria?**
- a) SAND- Screening for Aphasia in NeuroDegeneration
  - b) Batteria Comprendo per la comprensione di frasi negli adulti
  - c) APACS- Assessment of Pragmatic Abilities and Cognitive Substrates







**30) In caso di paralisi laringea bilaterale in abduzione cosa si osserva:**

- a) La funzione respiratoria è gravemente compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono conservate
- b) La funzione respiratoria non è compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono compromesse
- c) La funzione respiratoria e la funzionalità fonatoria e sfinterica sono gravemente compromesse

**31) Quale tipo di disfonia caratterizza la malattia di Parkinson?**

- a) Ipocinetica
- b) Ipercinetica
- c) Atassica

**32) Quali aree indaga il test di Robertson?**

- a) respirazione, fonazione, diadococinesi, riflessi, prosodia, articolazione, intelligibilità, muscolatura facciale
- b) fonazione, respirazione e attenzione selettiva
- c) respirazione, aprassia articolatoria, prosodia e memoria di lavoro

**33) Per cosa è utilizzata la scala GIRBAS?**

- a) per la valutazione delle abilità prassico-costruttive
- b) per la valutazione strumentale della disfonia
- c) per la valutazione percettiva della disfonia

**34) Quali esercizi vengono raccomandati per il trattamento di una disfonia conseguente a intubazione orotracheale?**


- a) Esercizi a Tratto Vocale Semi-Occluso (SOVTE)
- b) Ripetizione di parole e frasi
- c) Glissati e scale

**35) Nella SLA in fase avanzata quale ausilio comunicativo si ritiene più rispondente alle esigenze della persona assistita?**

- a) puntatore oculare
- b) amplificatore vocale
- c) tastiere con uscita vocale

6







**36) La disfonia ipercinetica ci caratterizza per:**

- a) fuga d'aria
- b) intensità debole
- c) voce strozzata

**37) Nell'aprassia ideomotoria:**

- a) il soggetto sa cosa fare ma non sa come farlo
- b) il soggetto non sa cosa fare e non sa come farlo
- c) il soggetto non sa cosa fare ma sa come farlo

**38) L'Esame del linguaggio al Letto del Malato (ELLM) valuta il disturbo afasico in fase:**

- a) non valuta l'afasia
- b) acuta
- c) cronica

**39) Quale tra queste è un'afasia fluente?:**

- a) afasia di Wernicke
- b) afasia globale
- c) afasia di Broca

**40) Quale tra questi è un deficit fonologico nell'afasia?**

- a) anomia
- b) neologismo fonemico
- c) circonlocuzione


## INFORMATICA

**1) In ambito informatico UPS è un sistema di:**

- a) Di prevenzione perimetrale contro hacker e virus
- b) Alimentazione elettrica di emergenza, dotato di batterie
- c) Generazione elettrica, che fornisce tensione alternata

## INGLESE

When you swallow, food passes through your mouth and into a part of your throat called the pharynx. From there, it travels through a long tube called the esophagus. It then enters your stomach. This movement is made possible by a series of actions from your muscles in these areas. If you have dysphagia, the muscles don't work correctly. You may not be able





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

to swallow normally.

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



## PROVA 1

- 1) L'Evidence-based medicine è:
  - a. un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotta dai medici e dai professionisti sanitari
  - b. un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente e dai caregiver
  - c. un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca**
  
- 2) Il segreto professionale cui sono vincolati i professionisti sanitari concerne:
  - a. la diagnosi relativa alla persona assistita
  - b. solo i dati anagrafici delle persone assistite
  - c. ogni notizia che può essere considerata un segreto relativo al paziente**
  
- 3) Quali test utilizzare per valutazione delle abilità narrative in un bambino di 4 anni?
  - a. Bus story**
  - b. BVSCO-3
  - c. Caselli
  
- 4) Quale test utilizzerebbe per valutare la comprensione del testo orale nella scuola secondaria di primo grado?
  - a. Zardini
  - b. CO-TT**
  - c. PING
  
- 5) Quali tra le seguenti prove vengono utilizzate per porre diagnosi di dislessia:
  - a. Correttezza e velocità di lettura di brano e liste di parole e non parole**
  - b. Velocità e comprensione della lettura di frasi omofone
  - c. Velocità e comprensione della lettura di parole quadrisillabiche

6) Quali sono i primi aspetti da osservare durante la valutazione di un bambino di 3 anni non verbale con sospetto disturbo dello spettro autistico?

- a. **Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, pointing, risposta al nome, comprensione di consegne semplici**
- b. Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, comprensione delle inferenze, pointing, narrazione autobiografica
- c. Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, risposta al nome, denominazione lessicale, discriminazione fonologica

7) Come viene definito il processo fonologico in cui il bambino sostituisce un suono sordo con il corrispondente suono sonoro?

- a. **sonorizzazione**
- b. stopping
- c. anteriorizzazione

8) La CAA è:

- a. utilizzata unicamente all'interno di istituti riabilitativi e scuole specializzate
- b. utilizza tabelle e dispositivi elettronici in alternativa a gesti e vocalizzi
- c. **utilizza le funzioni presenti e residue per ottenere uno scambio comunicativo**

9) Nello sviluppo della narrazione, la prima forma di racconto che il bambino mette in atto è:

- a. Il racconto biografico
- b. **Lo script**
- c. Il racconto di fantasia

10) Quale delle seguenti è una prova di valutazione delle abilità narrative di retelling?

- a. **Bus Story Test**
- b. PFLI
- c. PVB

11) Le procedure di screening per la disfagia dovrebbero includere:

- a. **Osservazione del livello di coscienza, dell'igiene orale, del controllo delle secrezioni e, se appropriato, un test del bolo d'acqua**
- b. Una valutazione della funzione deglutitoria con cibi a diversa consistenza
- c. Una valutazione strumentale (FEES o VFS)

12) Quali sono i vantaggi della cannula tracheostomica?

- a. **Riduzione del lavoro respiratorio, miglioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa**
- b. Aumento del lavoro respiratorio, miglior comfort del paziente e aumento della necessità di terapia farmacologica sedativa
- c. Aumento della frequenza respiratoria, peggioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa

13) Indicare l'esatta sequenza della manovra sovraglottica

- a. il paziente esegue tre masticazioni a vuoto; inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua ancora tre masticazioni a vuoto
- b. il paziente effettua un colpo di tosse; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua un secondo colpo di tosse
- c. **il paziente inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; mantiene l'apnea piena durante l'atto deglutitorio; effettua un colpo di tosse dopo la deglutizione**

14) Cosa si intende per penetrazione?

- a. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo con superamento del piano glottico
- b. **ingresso del bolo nel vestibolo laringeo senza superamento del piano glottico**
- c. ingresso del bolo nella cavità orale

15) La presbifagia secondaria:

- a. è dovuta ai soli processi fisiopatologici connessi con invecchiamento
- b. è sinonimo di disartria ed è riferita al soggetto anziano
- c. **è presente in un soggetto anziano ma conseguente e secondaria ad uno stato patologico**

16) Quali tra queste è una complicanza della disfagia?

- a. afasia di conduzione
- b. agnosia
- c. polmonite ab ingestis**

17) Cosa viene utilizzato per una diagnosi strumentale di disfagia?

- a. somministrazione di questionari
- b. test del bolo d'acqua e valutazione dei nervi cranici
- c. FEES e VFS**

18) Il VII paio di nervi cranici corrisponde al:

- a. facciale**
- b. glossofaringeo
- c. ipoglosso

19) Quale dei seguenti rientra tra i trattamenti restitutivi attivi della disfagia?

- a. modificazioni dietetiche
- b. capo flesso in avanti
- c. manovra di Masako**

20) Secondo le "linee guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in foniatría e logopedia", l'alimentazione tramite PEG è raccomandata:

- a. per tutti i pazienti con livello 7 alla scala DOSS
- b. mai con pazienti con stroke
- c. per periodi superiori alle 4 settimane**

21) Quali esercizi sono indicati per rinforzare i muscoli della deglutizione?

- a. Linguali, labiali, guance**
- b. Accordo pneumofonico
- c. Propriocezione e warming-up

22) Nella malattia di Parkinson la disfagia compare solitamente:

- a. dipende dall'età cronologica di insorgenza della malattia
- b. in media 10-11 anni dopo l'insorgenza dei disturbi motori**
- c. solo fase terminale della malattia

23) Nella valutazione della paralisi del facciale generalmente si utilizza:

- a. Sunnybrook Facial Grading System**
- b. Scala GIRBAS
- c. ENPA adattato

24) Quali sono le cause alla base della disfagia post-estubazione?

- a. aumento forza muscolare e acalasia esofagea
- b. trauma delle strutture faringee e laringee, ridotta sensibilità, debolezza muscolare**
- c. buona coordinazione tra respiro e deglutizione

25) L'esame utilizzato nelle procedure di screening audiologico alla nascita è:

- a. ABR
- b. OAE**
- c. Impedenzometria

26) Per amnesia retrograda si intende la difficoltà:

- a. A ricordare i volti conosciuti
- b. A ricordare i fatti autobiografici
- c. A rievocare i fatti accaduti prima dell'evento patologico**

27) Come si definisce una sordità neurosensoriale?

- a. Ipoacusia che interessa l'orecchio esterno e medio
- b. ipoacusia che interessa il nervo acustico**
- c. ipoacusia che interessa l'orecchio interno**

28) Da cosa è composto un impianto cocleare

- a. **un processore sonoro esterno e un ricevitore/stimolatore interno**
- b. un microfono, un amplificatore e un altoparlante
- c. un altoparlante, un amplificatore e uno stimolatore interno

29) Nella SLA in fase avanzata quale ausilio comunicativo si ritiene più rispondente alle esigenze della persona assistita?

- a. **puntatore oculare**
- b. amplificatore vocale
- c. tastiere con uscita vocale

30) La disfonia ipercinetica ci caratterizza per:

- a. **voce strozzata**
- b. intensità debole
- c. fuga d'aria

31) Per cosa è utilizzata la scala GIRBAS?

- a. per la valutazione delle abilità prassico-costruttive
- b. per la valutazione strumentale della disfonia
- c. **per la valutazione percettiva della disfonia**

32) Quale test è utilizzato per valutare la disartria?

- a. ENPA
- b. **Profilo di Robertson**
- c. AAT

33) Il Lee Silverman Voice Treatment è utile soprattutto nel trattamento della voce:

- a. della demenza di Alzheimer
- b. nel trauma cranico
- c. **nella malattia di Parkinson**

34) Una voce prodotta con insufficienza chiusura glottica può essere definita come:

- a. rauca
- b. instabile
- c. soffiata**

35) Cosa si intende per bradicinesia?

- a. difficoltà nella programmazione del movimento
- b. rigidità nell'esecuzione del movimento
- c. lentezza e diminuzione dell'ampiezza del movimento**

36) L'afasia è:

- a. un disturbo prassico-verbale
- b. un disturbo di linguaggio acquisito**
- c. un disturbo della produzione scritta

37) Quale tra queste è un'afasia fluente?

- a. afasia di Wernicke**
- b. afasia globale
- c. afasia di Broca

38) Quale tra questi è un deficit fonologico nell'afasia?

- a. anomia
- b. neologismo fonemico**
- c. circonlocuzione

39) L'aprassia bucco-facciale in un paziente con disturbo neurologico è caratterizzata da:

- a. deficit della forza della muscolatura del cavo orale preposti alla fonazione
- b. deficit nella produzione di movimenti volontari della bocca, faringe, muscoli del collo**
- c. presenza di lesioni cerebrali dell'emisfero destro e lesioni primarie degli organi del vocal tract

40) Il token test consente di evidenziare:

- a. deficit di denominazione
- b. deficit di ripetizione
- c. deficit della comprensione orale**

## PROVA 2

- 1) Il sistema di E.C.M (Formazione Continua in Medicina):
  - a. è previsto solo per i professionisti sanitari che lavorano presso Servizi Pubblici
  - b. è obbligatorio solo per i professionisti che lavorano in ambito privato
  - c. è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari**
  
- 2) Il profilo professionale del logopedista è individuato da:
  - a. DM 742/94**
  - b. L 170/2010
  - c. L 140/92
  
- 3) Quali prove effettuerebbe per valutare la comprensione morfosintattica in un bambino di 4 anni:
  - a. PVB
  - b. PING
  - c. TCGB-2**
  
- 4) Per una valutazione indiretta comunicativo-linguistica di un bambino di 10 mesi quale strumento utilizzerebbe:
  - a. Questionario Mc Arthur scheda parole e frasi
  - b. Questionario Mc Arthur scheda gesti e parole**
  - c. PING
  
- 5) Da che età è possibile fare diagnosi di discalculia?
  - a. Non prima della fine della terza primaria**
  - b. Non prima della fine della seconda primaria
  - c. Non prima della fine della quinta primaria
  
- 6) Il linguaggio caratterizzato da ecolalia è tipico di:
  - a. bambini con DPL in comprensione ed espressione
  - b. bambini con disturbo dello spettro autistico**
  - c. bambini bilingui precoci

7) I processi fonologici di sistema:

- a. Indicano quei processi in cui all'interno della stessa parola si trovano almeno due processi contemporaneamente
- b. Riguardano la sostituzione di un fonema con un altro, mentre la sequenza sillabica rimane inalterata**
- c. Indicano quei processi in cui vi è una persistente preferenza per dei suoni

8) Si parla di bilinguismo consecutivo tardivo quando:

- a. la seconda lingua è gestuale
- b. il bambino viene esposto alla seconda lingua a partire dai 6/7 anni**
- c. il bambino viene esposto alla seconda lingua dalla nascita

9) Cos'è la lallazione canonica:

- a. la produzione ripetuta della stessa sequenza CV**
- b. la ripetizione della prima parola
- c. il prolungamento di un suono

10) Quale dei seguenti è classificabile come errore non fonologico?

- a. "in sieme" anziché "insieme"**
- b. "pitta" anziché "pizza"
- c. "aejo" anziché "aereo"

11) Se durante la procedura di screening per disfagia si osserva che il paziente non può stare seduto con il tronco eretto e non riesce a rimanere sveglio per almeno 5 minuti come si procede:

- a. Non somministrare nulla per bocca e mantenere l'igiene orale**
- b. Iniziare l'alimentazione orale con cautela partendo da cibi morbidi
- c. Iniziare l'alimentazione orale con cautela partendo dai liquidi non zuccherati

12) Nel paziente portatore di cannula tracheostomica cuffiata, quando è possibile eseguire una prova di scuffiatura?

- a. Quando la valutazione logopedica non mostra alterazioni morfodinamiche del distretto orale
- b. Quando si è certi che non sono comparsi segni di disfagia durante l'assunzione degli alimenti
- c. Quando il paziente ha raggiunto la stabilità clinica e respiratoria**

13) La manovra sovraglottica:

- a. prevede il prolungamento della fase di chiusura delle corde vocali tramite apnea, con lo scopo di impedire l'inalazione del bolo**
- b. va attuata solo ed esclusivamente in presenza del logopedista
- c. fa parte delle posture di compenso utilizzate per la riabilitazione della disfagia

14) Cosa si intende per inalazione/aspirazione?

- a. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo con superamento del piano glottico**
- b. ingresso del bolo nel vestibolo laringeo senza superamento del piano glottico
- c. ingresso del bolo nella cavità orale

15) Che cosa è la presbifagia?

- a. E' la forma di disfagia dovuta ai processi fisiopatologici connessi con l'invecchiamento**
- b. E' un sinonimo di afasia, ma riferita unicamente alla persona anziana
- c. E' una forma di demenza legata al fisiologico invecchiamento

16) Quale dei seguenti è uno strumento di screening per la disfagia?

- a. FEES
- b. GUSS**
- c. FOIS

17) Quale tra queste è una fase della deglutizione?

- a. fase epatica
- b. fase faringea**
- c. fase nasale

18) Il XII paio di nervi cranici corrisponde al:

- a. facciale
- b. glossofaringeo
- c. **ipoglosso**

19) Quale dei seguenti rientra tra i trattamenti compensativi della disfagia?

- a. **modificazioni della consistenza di cibi e liquidi**
- b. CTAR
- c. Manovra di Masako

20) Cosa analizza lo SWAL-QoL?

- a. La scialorrea nel paziente disfagico
- b. **Quanto la disfagia incide sulla qualità della vita del paziente e dei caregiver**
- c. Se parlare rappresenta un handicap per il paziente

21) Quali esercizi sono indicati per il training masticatorio?

- a. Manovre di autoinsufflazione
- b. Respirazione diaframmatica e accordo pneumofonico
- c. **Protrusione e retrazione mandibolare, rinforzo dei masseteri**

22) Il muscolo cricoaritenideo laterale è un muscolo:

- a. estrinseco laringeo
- b. **adduttore della laringe**
- c. abduzione della laringe

23) Quale tra i seguenti interventi porta alla definitiva separazione tra vie aeree e digestive superiori?

- a. cordectomia
- b. laringectomia sovraglottica
- c. **laringectomia totale**

24) La disfagia nella SLA:

- a. interessa solo la fase esofagea
- b. è caratterizzata da progressiva diminuzione della forza ed escursione laringea debole**
- c. è dovuta ad una lesione del cervelletto

25) Quale di questi è un test specifico per l'afasia progressiva primaria?

- a. SAND- Screening for Aphasia in NeuroDegeneration**
- b. Batteria Comprendo per la comprensione di frasi negli adulti
- c. APACS- Assessment of Pragmatic Abilities and Cognitive Substrates

26) Le agende cartacee/elettroniche sono utilizzate soprattutto in caso di disturbo della:

- a. Memoria di lavoro
- b. Memoria prospettica**
- c. Attenzione sostenuta

27) Come si definisce una sordità trasmissiva?

- a. Ipoacusia che interessa l'orecchio esterno e medio**
- b. ipoacusia che interessa il nervo acustico
- c. ipoacusia che interessa l'orecchio interno

28) In seguito all'intervento chirurgico di impianto cocleare la regolazione degli elettrodi viene effettuata attraverso:

- a. la telemetria neurale
- b. il mappaggio**
- c. l'ABR

29) Quali aree indaga il test di Robertson?

- a. **respirazione, fonazione, diadococinesi, riflessi, prosodia, articolazione, intelligibilità, muscolatura facciale**
- b. fonazione, respirazione e attenzione selettiva
- c. respirazione, aprassia articolatoria, prosodia e memoria di lavoro

30) In caso di paralisi laringea bilaterale in abduzione cosa si osserva:

- a. La funzione respiratoria è gravemente compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono conservate
- b. **la funzione respiratoria non è compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono compromesse**
- c. la funzione respiratoria e la funzionalità fonatoria e sfinterica sono gravemente compromesse

31) Quale tipo di disfonia caratterizza la malattia di Parkinson?

- a. **Ipocinetica**
- b. Ipercinetica
- c. Atassica

32) Che strumento, tra quelli utilizzati dal logopedista, viene identificato con la sigla VHI:

- a. test di screening della deglutizione
- b. questionario di autovalutazione della disartria
- c. **questionario di autovalutazione della voce**

33) Quali esercizi vengono raccomandati per il trattamento di una disfonia conseguente a intubazione orotracheale?

- a. **Esercizi a Tratto Vocale Semi-Occluso (SOVTE)**
- b. Ripetizione di parole e frasi
- c. Glissati e scale

34) Le corde vocali si trovano:

- a. nella regione sottoglottica
- b. nella regione glottica**
- c. nella regione sottoglottica

35) Nella paralisi sopranucleare progressiva PSP, il sintomo cardine è:

- a. tetraplegia progressiva
- b. afasia progressiva
- c. progressiva paralisi dello sguardo**

36) La comprensione verbale è una funzione complessa che dipende da:

- a. area di Wernicke**
- b. area di Broca
- c. aree parietali

37) Quale tra questi è un deficit lessicale nell'afasia?

- a. anomia**
- b. parafasia fonemica
- c. conduite d'approche

38) L'esame del linguaggio al Letto del Malato (ELLM) valuta il disturbo afasico in fase:

- a. acuta**
- b. cronica
- c. non valuta l'afasia

39) Quale tra queste è un'afasia non fluente?

- a. afasia di Wernicke
- b. afasia di conduzione
- c. afasia di Broca**

40) Nell'aprassia ideomotoria:

- a. **il soggetto sa cosa fare ma non sa come farlo**
- b. il soggetto non sa cosa fare e non sa come farlo
- c. il soggetto non sa cosa fare ma sa come farlo

### PROVA 3

- 1) L'evidence-based medicine è:
  - a) un particolare metodo statistico applicato alla ricerca condotto dai medici e dai professionisti sanitari
  - b) un approccio assistenziale basato sulla qualità percepita dal paziente e dai caregiver
  - c) **un approccio clinico basato sulla valutazione e sul buon utilizzo delle informazioni che provengono dalla ricerca**
  
- 2) Il profilo professionale del logopedista è individuato da:
  - a) **DM 742/94**
  - b) L170/2010
  - c) L140/92
  
- 3) Nel bambino con sindrome di Down l'intervento logopedico precoce sulle funzioni orali è raccomandato in quanto questi bambini sin dalla nascita presentano:
  - a) Iperprotezione buccale associata a rigurgito nasale
  - b) **Ipotonia, frequenti problemi respiratori, particolarità delle strutture anatomiche del cavo orale, sensibilità**
  - c) Acalasia esofagea che provoca una difficoltosa progressione del cibo con conseguenti disturbi del comportamento
  
- 4) Quale delle seguenti è una prova di valutazione delle abilità narrative di retelling?
  - a) **Bus Story Test**
  - b) PFLI
  - c) PVB
  
- 5) Come viene definito il processo fonologico in cui il bambino sostituisce un suono sordo con il corrispondente suono sonoro?
  - a) **sonorizzazione**
  - b) stopping
  - c) anteriorizzazione
  
- 6) Quali sono i primi aspetti da osservare durante la valutazione di un bambino di 3 anni non verbale con sospetto disturbo dello spettro autistico?
  - a) **Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, pointing, risposta al nome, comprensione di consegne semplici**
  - b) Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, comprensione delle inferenze, pointing, narrazione autobiografica
  - c) Contatto di sguardo, triangolazione dello sguardo, risposta al nome, denominazione lessicale, discriminazione fonologica
  
- 7) Quali tra le seguenti prove vengono utilizzate per porre diagnosi di dislessia:
  - a) Velocità e comprensione della lettura di frasi omofone
  - b) **Correttezza e velocità di lettura di brano e liste di parole e non parole**
  - c) Velocità e comprensione della lettura di parole quadrisillabiche

- 8) I processi fonologici di sistema:
- Indicano quei processi in cui all'interno della stessa parola si trovano almeno due processi contemporaneamente
  - Riguardano la sostituzione di un fonema con un altro, mentre la sequenza sillabica rimane inalterata**
  - Indicano quei processi in cui vi è una persistente preferenza per dei suoni
- 9) Da che età è possibile fare diagnosi di discalculia?
- Non prima della fine della seconda primaria
  - Non prima della fine della terza primaria**
  - Non prima della fine della quinta primaria
- 10) Quali prove effettuerebbe per valutare la comprensione morfosintattica in un bambino di 4 anni:
- PVB
  - PING
  - TCGB-2**
- 11) Nel paziente portatore di cannula tracheostomica cuffiata, quando è possibile eseguire una prova di scuffiatura?
- Quando la valutazione logopedica non mostra alterazioni morfodinamiche del distretto orale
  - Quando si è certi che non sono comparsi segni di disfagia durante l'assunzione degli alimenti
  - Quando il paziente ha raggiunto la stabilità clinica e respiratoria**
- 12) Quali sono i vantaggi della cannula tracheostomica?
- Riduzione del lavoro respiratorio, miglioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa**
  - Aumento del lavoro respiratorio, miglior comfort del paziente e aumento della necessità di terapia farmacologica sedativa
  - Aumento della frequenza respiratoria, peggioramento nella gestione delle secrezioni, miglior comfort del paziente e riduzione della necessità di terapia farmacologica sedativa
- 13) Cosa indaga lo SWAL-QoL?
- La scialorrea nel paziente disfagico
  - Quanto la disfagia incide sulla qualità della vita del paziente e dei caregiver**
  - Se parlare rappresenta un handicap per il paziente
- 14) Indicare l'esatta sequenza della manovra sovraglottica
- il paziente esegue tre masticazioni a vuoto; inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua ancora tre masticazioni a vuoto
  - il paziente effettua un colpo di tosse; inserisce il cibo nel cavo orale; deglutisce; effettua un secondo colpo di tosse
  - il paziente inspira; inserisce il cibo nel cavo orale; mantiene l'apnea piena durante l'atto deglutitorio; effettua un colpo di tosse dopo la deglutizione**

- 15) Il IX paio di nervi cranici corrisponde al:
- facciale
  - glossofaringeo**
  - ipoglosso
- 16) Quali esercizi sono indicati per il training masticatorio?
- Manovre di autoinsufflazione
  - Respirazione diaframmatica e accordo pneumofonico
  - Protrusione e retrazione mandibolare, rinforzo dei masseteri**
- 17) Che cosa è la presbifagia?
- E' la forma di disfagia dovuta ai processi fisiopatologici connessi con l'invecchiamento**
  - E' un sinonimo di afasia, ma riferita unicamente alla persona anziana
  - E' una forma di demenza legata al fisiologico invecchiamento
- 18) Quale dei seguenti è uno strumento di screening per la disfagia?
- FEES
  - GUSS**
  - FOIS
- 19) Cosa si intende per inalazione/aspirazione?
- ingresso del bolo nel vestibolo laringeo con superamento del piano glottico**
  - ingresso del bolo nel vestibolo laringeo senza superamento del piano glottico
  - ingresso del bolo nella cavità orale
- 20) Quale dei seguenti rientra tra i trattamenti compensativi della disfagia?
- modificazioni della consistenza di cibi e liquidi**
  - CTAR
  - Manovra di Masako
- 21) Cosa viene utilizzato per una diagnosi strumentale di disfagia?
- somministrazione di questionari ai pazienti e caregiver
  - test del bolo d'acqua e valutazione dei nervi cranici
  - FEES e VFS**
- 22) Quali sono le cause alla base della disfagia post-estubazione?
- aumento forza muscolare e acalasia esofagea
  - trauma delle strutture faringee e laringee, ridotta sensibilità, debolezza muscolare**
  - buona coordinazione tra respiro e deglutizione
- 23) Secondo le "linee guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in foniatra e logopedia", l'alimentazione tramite PEG è raccomandata:
- per tutti i pazienti con livello 7 alla scala DOSS
  - mai con pazienti con stroke
  - per periodi superiori alle 4 settimane**

- 24) Nella valutazione della paralisi del facciale generalmente si utilizza:
- a) **Sunnybrook Facial Grading System**
  - b) Scala GIRBAS
  - c) ENPA adattato
- 25) Nella malattia di Parkinson la disfagia compare solitamente:
- a) dipende dall'età cronologica di insorgenza della malattia
  - b) **in media 10-11 anni dopo l'insorgenza dei disturbi motori**
  - c) solo fase terminale della malattia
- 26) Da cosa è composto un impianto cocleare:
- a) **un processore sonoro esterno e un ricevitore/stimolatore interno**
  - b) un microfono, un amplificatore e un altoparlante
  - c) un altoparlante, un amplificatore e uno stimolatore interno
- 27) Come si definisce una sordità trasmissiva?
- a) ipoacusia che interessa il nervo acustico
  - b) **ipoacusia che interessa l'orecchio esterno e medio**
  - c) ipoacusia che interessa l'orecchio interno
- 28) Per amnesia retrograda si intende la difficoltà:
- a) a ricordare i volti conosciuti
  - b) a ricordare i fatti autobiografici
  - c) **a rievocare i fatti accaduti prima dell'evento patologico**
- 29) Quale di questi è un test specifico per l'afasia progressiva primaria?
- a) **SAND- Screening for Aphasia in NeuroDegeneration**
  - b) Batteria Comprendo per la comprensione di frasi negli adulti
  - c) APACS- Assessment of Pragmatic Abilities and Cognitive Substrates
- 30) In caso di paralisi laringea bilaterale in abduzione cosa si osserva:
- a) La funzione respiratoria è gravemente compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono conservate
  - b) **La funzione respiratoria non è compromessa e la funzione fonatoria e sfinterica della laringe sono compromesse**
  - c) La funzione respiratoria e la funzionalità fonatoria e sfinterica sono gravemente compromesse
- 31) Quale tipo di disfonia caratterizza la malattia di Parkinson?
- a) **Ipocinetica**
  - b) Ipercinetica
  - c) Atassica
- 32) Quali aree indaga il test di Robertson?
- a) **respirazione, fonazione, diadococinesi, riflessi, prosodia, articolazione, intelligibilità, muscolatura facciale**
  - b) fonazione, respirazione e attenzione selettiva
  - c) respirazione, aprassia articolatoria, prosodia e memoria di lavoro

- 33) Per cosa è utilizzata la scala GIRBAS?
- a) per la valutazione delle abilità prassico-costruttive
  - b) per la valutazione strumentale della disfonia
  - c) **per la valutazione percettiva della disfonia**
- 34) Quali esercizi vengono raccomandati per il trattamento di una disfonia conseguente a intubazione orotracheale?
- a) **Esercizi a Tratto Vocale Semi-Occluso (SOVTE)**
  - b) Ripetizione di parole e frasi
  - c) Glissati e scale
- 35) Nella SLA in fase avanzata quale ausilio comunicativo si ritiene più rispondente alle esigenze della persona assistita?
- a) **puntatore oculare**
  - b) amplificatore vocale
  - c) tastiere con uscita vocale
- 36) La disfonia ipercinetica ci caratterizza per:
- a) fuga d'aria
  - b) intensità debole
  - c) **voce strozzata**
- 37) Nell'aprassia ideomotoria:
- a) **il soggetto sa cosa fare ma non sa come farlo**
  - b) il soggetto non sa cosa fare e non sa come farlo
  - c) il soggetto non sa cosa fare ma sa come farlo
- 38) L'Esame del linguaggio al Letto del Malato (ELLM) valuta il disturbo afasico in fase:
- a) non valuta l'afasia
  - b) **acuta**
  - c) cronica
- 39) Quale tra queste è un'afasia fluente?:
- a) **afasia di Wernicke**
  - b) afasia globale
  - c) afasia di Broca
- 40) Quale tra questi è un deficit fonologico nell'afasia?
- a) anomia
  - b) **neologismo fonemico**
  - c) circonlocuzione

