

 <p>Centre de traumatologie orthopédique Gaetano Pini-CTO</p>	Note d'information	Rév. 0	Page 1/1
	Instructions pour la collecte des urines en vue d'une urinoculture	P06_A0250_MAN001_FI006 Réf. P06_A0250_MAN001	

L'urine doit être recueillie dans un récipient stérile à usage unique muni d'un bouchon à vis et équipé d'un système sous vide (avec sonde de prélèvement intégrée) fourni gratuitement dans notre point de collecte ou disponible en pharmacie ; à titre exceptionnel, il est possible d'utiliser un récipient stérile en plastique à large ouverture muni d'un bouchon à vis, également fourni par la pharmacie.

En cas de **symptômes graves**, l'échantillon peut être prélevé à tout moment ; dans tous les autres cas (contrôles chez les femmes enceintes, contrôles après traitement, etc.), pour pouvoir fournir des données fiables sur la charge bactérienne, l'échantillon doit provenir de la première urine du matin ou, si cela n'est pas possible, il doit être prélevé au moins trois heures après une précédente miction.

La récolte doit être effectuée selon la méthode de l'urine de milieu de jet , en procédant comme suit :

⇒ se laver soigneusement les mains ;

⇒ nettoyer soigneusement les organes génitaux externes avec du savon et de l'eau chaude et rincer abondamment la zone concernée ;

⇒ les femmes doivent écarter les grandes lèvres d'une main et les hommes doivent maintenir le gland complètement rétracté pendant le nettoyage de la peau et le prélèvement d'échantillons ;

⇒ commencer à uriner dans les toilettes puis arrêter ;

⇒ recommencer à uriner directement dans le récipient stérile (en prenant soin de ne pas toucher les parois intérieures ni les bords du récipient avec les mains) sans dépasser la moitié du récipient ;

⇒ terminer d'uriner dans les toilettes ;

⇒ fermer rapidement le récipient après la collecte en vérifiant d'avoir recueillie une quantité d'urine correspondant à la limite MAX du récipient (50 ml).

Remettre l'échantillon au laboratoire le plus rapidement possible ; si cela n'est pas possible, conserver l'échantillon au réfrigérateur pendant 24 heures au maximum.

Tout traitement antibiotique doit avoir été interrompu depuis au moins une semaine, sauf indication contraire du médecin traitant.

07/01/2024

Document propriété de l'ASST G. Pini - CTO, à usage exclusif des destinataires.

Toute divulgation du document, en tout ou partie, à des tiers est interdite sans l'autorisation écrite du Directeur Général.

Distribution contrôlée sous format électronique.