

 创伤骨科专科中心 加埃塔诺·皮尼-CTO	信息表	版本 0	第 1 / 1 页
	用于尿液培养的尿液采集说明	P06_A0250_MAN001_FI006 编号 P06_A0250_MAN001	

尿液必须收集在一次性无菌容器中，容器带有螺旋盖，并配有真空系统（已集成采样探针），由我们的采样点免费提供或从药房领取；在特殊情况下，也可使用由药房提供的带有螺旋盖的无菌广口塑料容器。

在出现**急性症状**的情况下，可在任何时间采集样本；在所有其他情况下（孕妇对照组、治疗后对照组等），为了得到可靠的细菌负荷数据，样本必须来自晨尿，如果无法做到这一点，则必须在前一次排尿后至少三小时采集样本。

必须按照中段采集的方法进行采集，采集程序如下：

- ⇒ 仔细清洗双手；
- ⇒ 用肥皂溶液和温水彻底清洁外生殖器，并彻底冲洗患处；
- ⇒ 在清洁皮肤和采集样本时，女性必须用一只手分开大阴唇，男性必须将龟头皮肤完全缩回；
- ⇒ 开始在便池厕所小便，然后停止小便；
- ⇒ 恢复小便，直接向无菌容器内排尿（注意不要用手接触容器内壁和边缘），尿液不要超过容器的一半；
- ⇒ 停止在便池小便；
- ⇒ 采集结束后，检查采集到的尿量达到容器的最大限度（50 毫升），然后迅速关闭容器。

尽快送交样本；如果要延迟送交，则必须保存在冰箱中最多 24 小时。

除非主治医师另有规定，否则任何抗生素治疗必须停止至少一周。