

 Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico	ورقة المعلومات	Rev. 0	Pag. 1 di 1
	تعليمات لجمع البول تحليل البول	P06_A0250_MAN001_FI006 Rif. P06_A0250_MAN001	

يجب جمع البول في حاوية معقمة يمكن التخلص منها بغطاء لولبي ومجهزة بنظام فراغ (مكتمل بمسبار مدمج لأخذ العينات) يتم توفيرها مجاناً في نقطة جمع الدم التابع لنا أو متوفرة في الصيدليات؛ بشكل استثنائي، يتم أيضاً قبول حاوية بلاستيكية معقمة ذات فوهة واسعة وغطاء لولبي، يتم توفيرها دائماً من الصيدلية.

في حالة ظهور أعراض حادة، يمكن جمع العينة في أي وقت؛ في جميع الحالات الأخرى (الفحوصات على النساء الحوامل، الفحوصات بعد العلاج، إلخ)، لتوفير بيانات موثوقة عن الحمل البكتيري، يجب أن تكون العينة من أول بول في الصباح أو، إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب أن يتم الجمع بعد مرور ما لا يقل عن ثلاث ساعات من التبول السابق.

لا يجب أن يتم الجمع باتتباع تقنية "التبول الوسطي"؛ مع هذا الإجراء:
↩ اغسل يديك جيداً؛
↩ تنظيف الأعضاء التناسلية الخارجية جيداً بالمحلول الصابوني والماء الدافئ وشطف جيداً المنطقة التي تهتك ؛
↩ يجب على النساء إبقاء الشفرين الكبيرين منفصلين بيد واحدة، ويجب على الرجال إبقاء جلد الحشفة منسحباً تماماً أثناء تنظيف الجلد وجمع العينات؛
↩ البدء بالتبول في المرحاض والتوقف عن التبول؛
↩ العودة للتبول مباشرة في الحاوية المعقمة (مع الحرص على عدم لمس الجدران الداخلية وحواف الحاوية بيديك) دون تجاوز منتصف الحاوية ؛
↩ الانتهاء من التبول في المرحاض؛
↩ أغلق الحاوية بسرعة في نهاية التجميع، وتأكد من أنك جمعت كمية من البول تساوي الحد الأقصى للحاوية (50 مل).
تسليم العينة في أقرب وقت ممكن؛ في حالة تأخر التسليم، يجب حفظه في الثلاجة لمدة أقصى تصل إلى 24 ساعة.
من الضروري إيقاف أي علاج بالمضادات الحيوية لمدة أسبوع على الأقل ما لم يشير الطبيب المعالج إلى خلاف ذلك.

07/01/2024